

DLd(Dara点滴+LEN+dex)	対象疾患	多発性骨髄腫	1コース	28日間
---------------------	------	--------	------	------

1コース

	投与量		投与時間		
アトアミノフェン錠 コルヒエラミン錠 モンテルカスト錠	800 2 10	mg mg mg	ダラツママ [®] 開始 1時間前に服用	前投薬	day1.8.15.22
デキサメタゾン注6.6mg	2	本	15min		day1.8.15.22
デキサメタゾン注3.3mg	1	本			
生食50mL	1	本			
生食100mL	1	本	60min		day1.8.15.22
ダラツママ [®] 点滴	16	mg/kg		0～1時間は50mL/hr、1～2時間は100mL/hr、 2～3時間は150mL/hr、3～4時間は 200mL/hr。 1コース目、投与3時間以内にinfusion reactionを認めなかった場合、希釈液量を 500mLにすることができる。	day1
生食1000mL	1	本			
ダラツママ [®] 点滴	16	mg/kg		2コース目までに、100mL/hrの速度でinfusion reactionがなければ、3コース目から100mL/hr で投与できる	day8.15.22
生食500mL	1	本			
レリトミド [®] 錠	25	mg	朝食後		day1～21
デキサメタゾン(レデックス)錠	20	mg			day2.9.16.23

2コース

	投与量		投与時間		
アセトアミノフェン錠 ケルフェニラミン錠	800 2	mg mg	ダラツムマブ [®] 開始1時間前に服用	前投薬	day1.8.15.22
デキサメタゾン注6.6mg	2	本	15min		day1.8.15.22
デキサメタゾン注3.3mg	1	本			
生食50mL	1	本			
生食100mL	1	本	60min		day1.8.15.22
ダラツムマブ [®] 点滴	16	mg/kg		2コース目までに、100mL/hrの速度で infusion reactionがなければ、3コース目から100mL/hrで投与できる	day1.8.15.22
生食500mL	1	本			
けつ [®] ミド [®] 錠	25	mg	朝食後		day1~21
デキサメタゾン(レデックス)錠	20	mg			day2.9.16.23

3~6コース

	投与量		投与時間		
アトアミノフェン錠 ケルフェニラミン錠	800 2	mg mg	ダラムマブ 開始1時間前に服用	前投薬	day1.15
デキサメタゾン注6.6mg	2	本	15min		day1.15
デキサメタゾン注3.3mg	1	本			
生食50mL	1	本			
生食100mL	1	本	60min		day1.15
ダラムマブ 点滴	16	mg/kg		2コース目までに、100mL/hrの速度で infusion reactionがなければ、3コース目から100mL/hrで投与できる	day1.15
生食500mL	1	本			
レリトミド錠	25	mg	朝食後		day1~21
デキサメタゾン(レデックス)錠	20	mg			day2.8.9.16.22.23

7コース目以降

	投与量		投与時間		
アトアミノフェン錠 ケルフェニラミン錠	800 2	mg mg	ダラムマブ 開始1時間前に服用	前投薬	day1
デキサメタゾン注6.6mg	2	本	15min		day1
デキサメタゾン注3.3mg	1	本			
生食50mL	1	本			
生食100mL	1	本	60min		day1
ダラムマブ 点滴	16	mg/kg		2コース目までに、100mL/hrの速度で infusion reactionがなければ、3コース目から100mL/hrで投与できる	day1
生食500mL	1	本			
レリトミド錠	25	mg	朝食後		day1~21
デキサメタゾン(レデックス)錠	20	mg			day2.8.9.15.16.22.23