

G-CHOP(CPA+ADM+VCR+PSL)	対象疾患	CD20陽性FL	1コース	21日間
-------------------------	------	----------	------	------

初回

	投与量		投与時間		
アピレピタントCap	125	mg	ホ`ヌズ`マ` 投与30分前	前投薬	day1.8.15
アセトアミノフェン錠 ケルフェリン錠	400 2	mg mg	ホ`ヌズ`マ`投 与30分前		
プレドニゾロン錠	60	mg/m ²	朝食後		day1~5
ホ`ヌズ`マ` 生食250mL(全量250mL)	1000	mg/m ²	min	30分おきに12.5mL/hr、25、37.5、50、62.5、75、 87.5、100mL/hrへ速度をあげる	day1.8.15
生食	50	mL	30min		day1
生食	100	mL	30min		day8.15
パ`ロ`ト`点滴0.75mg	1	本	15min		day1
ト`キル`シ` 生食50mL	50	mg/m ²	10min		day1
ビ`ンクリ`チ` 生食50mL	1.4 1	mg/m ² 本	10min	上限2mg/bodyまで	day1
シ`ロ`フ`ス`ア`ミ` 生食500mL	750 1	mg/m ² 本	120min		
アピレピタントCap	80	mg	朝食後		day2.3

2～6コース

	投与量		投与時間		
アピレピタントCap	125	mg	牝 ^レ ヌズ ^マ マ ^レ 投与30分前	前投薬	day1
牝 ^レ ト ^ア ミ ^ノ カ ^エ ン錠 カ ^ル カ ^エ ニ ^ア ミン錠	400 2	mg mg	牝 ^レ ヌズ ^マ マ ^レ 投与30分前		
プレドニゾロン錠	60	mg/m ²	朝食後		day1～5
牝 ^レ ヌズ ^マ マ ^レ 生食250mL(全量250mL)	1000	mg/m ²	min	30分おきに25、50、75、100mL/hr	day1
生食	50	mL	30min		day1
パ ^ロ ロ ^ト の ^点 滴0.75mg	1	本	15min		day1
ド ^キ ル ^ビ シ ^ン 生食50mL	50	mg/m ²	10min		day1
ビ ^ン クリ ^ス チ ^ン	1.4	mg/m ²	10min	上限2mg/bodyまで	day1
生食50mL	1	本			
シ ^ロ オ ^ス ノ ^ア ミ ^ド	750	mg/m ²	120min		day1
生食500mL	1	本			
アピレピタントCap	80	mg	朝食後		day2.3

7～8コース

	投与量		投与時間		
牝 ^レ ト ^ア ミ ^ノ カ ^エ ン錠 カ ^ル カ ^エ ニ ^ア ミン錠	400 2	mg mg	牝 ^レ ヌズ ^マ マ ^レ 投与30分前		day1
牝 ^レ ヌズ ^マ マ ^レ 生食250mL(全量250mL)	1000	mg/m ²	min	30分おきに25、50、75、100mL/hr	day1
生食	100	mL	30min		day1