R-CHOP(CPA+ADM+VCR+PSL)	対象疾患	NHL	1コース	21日間

	投与量		投与時間		
アピレピタントCap	125	mg	リツキシマブ投与30分前	前投薬	day1
ｱｾﾄｱﾐﾉﾌｪﾝ錠 ｸﾛﾙﾌｪﾆﾗﾐﾝ錠	800 2	mg mg			day1
プレドニゾロン錠	40-60	mg/m^2	朝食後		day1～5
ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(ｿﾙｺｰﾃﾌ) 生食20mL	100	mg			day1
ﾘﾂｷｼﾏﾌﾞ 生食500mL	375	mg/m^2	min	R投与量:BSA≦1.33:500mg、1.34～1.6:600mg、1.61～1.86:700mg、1.87≦BSA:800mg 初回:30分おきに50mL/hr、100、150、200、250、300、350、400mL/hrへ速度をあげる。 2回目以降　30分おきに100、200、300、400mL/hr	day1
ﾊﾟﾛﾉｾﾄﾛﾝ点滴0.75mg	1	本	15min		day1
ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ 生食50mL	50	mg/m^2	10min		day1
ﾋﾞﾝｸﾘｽﾁﾝ	1.4	mg/m^2	10min	上限2mg/bodyまで	day1
生食50mL	1	本			
ｼｸﾛﾌｫｽﾌｧﾐﾄﾞ	750	mg/m^2	120min		day1
生食500mL	1	本			
アピレピタントCap	80	mg	朝食後		day2.3